

n'atteignent pas tout à fait le sommet des élytres et ne portent en dessous qu'une petite dent tuberculiforme, située non loin du sommet; les tibias sont grêles, régulièrement incurvés et privés de la grande dent médiane.

Longueur : ♂, 10 mill.; ♀, 8 mill. — Largeur aux épaules : ♂, 4 mill. 1/2; ♀ 3 mill. 1/2.

La connaissance de la ♀ de *S. humeralis* Jac. confirme la parenté étroite de cette espèce avec *S. Peteli* Lac., de Java, près duquel elle doit prendre place.

Les *Silis* Latr. du Tonkin et de Cochinchine

[COL. MALACODERMATA]

par Maurice Pic.

Une demi-douzaine seulement d'espèces rentrant dans le genre *Silis* Latr. sont connues du Tonkin ou de la Cochinchine; les unes offrent une coloration élytrale foncée : *S. carinaticeps* Pic, *Donckieri* Pic, du Tonkin (1); une seule a les élytres bicolorés, c'est-à-dire testacés à bordure noire : *atrocineta* Pic; enfin, les autres, dont je vais m'occuper ici, présentent une coloration élytrale testacée : *S. robusticornis* Pic, *grandiceps* Pic (2), déjà décrites, puis *S. Lajoyei*, n. sp.

Après la description de cette dernière espèce, je donnerai un tableau dichotomique qui aidera à la distinguer de ses deux voisines.

Silis Lajoyei, n. sp., ♀. — *Modice elongata et satis lata, nitida, griseo pubescens, testacea, elytris pallidioribus, oculis, antennis, geniculis, tibiis tarsisque nigris.*

Modérément allongé et assez large, brillant, revêtu d'une pubes-

(1) Je possède une 3^e espèce inédite, du Tonkin, que je nomme *Silis tonkinea*, n. sp.; celle-ci est assez allongée; le prothorax est sinué et fortement entaillé sur les côtés; cet organe est testacé, les cuisses et la base des tibias sont également testacés, le devant de la tête est roux, et le reste du corps noir. Long. 5 mill.

(2) Cette espèce est originaire de Vinh-Long, en Cochinchine (et non Wink-Lang, comme il a été imprimé au moment de la description de l'espèce (*L'Échange*, N° 318 [1911], p. 144).

cence grise en partie soulevée, testacé avec les élytres plus clairs, yeux, antennes (1^{er} article taché de roux en-dessous), genoux, tibias et tarses noirs. Tête assez large, déprimée entre les yeux; antennes grêles, dépassant peu le milieu du corps; prothorax presque lisse, assez court et large, subarqué en avant, sinué postérieurement, faiblement échancré sur le milieu des côtés; élytres peu plus larges que le prothorax, faiblement élargis vers le milieu, peu rétrécis au sommet, rebordés latéralement, finement et ruguleusement ponctués avec des traces de côtes sur le disque; dessous du corps de la couleur du prothorax, parfois avec la poitrine tachée de foncé; pattes noires avec les cuisses, sommet excepté, testacées. Long. 9-10 mill.

Tonkin : Bao-Lac (*types* et *co-types* in collections LAJOYE et PIC).

Je suis heureux de dédier cette espèce à un de nos plus aimables collègues, en souvenir de ses communications intéressantes et désintéressées.

1. Tête moyenne, avec les yeux, pas plus large que le prothorax; antennes toutes noires, à 1^{er} article seul taché de roux..... 2.

— Tête grosse, avec les yeux, plus large que le prothorax; antennes noires avec les derniers articles flaves. Long. 7 mill.

Cochinchine : Vinh-Long..... *grandiceps* PIC.

2. Antennes robustes (plus longues chez ♂); prothorax très transversal; tête noire en arrière. Long. 6,5-8 mill.

Tonkin : Dap-Can, Hanoi..... *robusticornis* PIC.

— Antennes grêles; prothorax moins transversal; tête entièrement testacée. Long. 9-10 mill.

Tonkin : Bao-Lac..... *Lajoiei* PIC.

**Sur la présence de l'*Icerya Purchasi* MASK. [HEM. COCCIDAE]
et du *Novius cardinalis* MULS. [COL. COCCINELLIDAE]
dans les Alpes-Maritimes**

par A. VUILLET.

Au cours de l'été de 1940, avec des plantes venues de Naples, une Cochenille de la tribu des *Monophlebinæ*, *Icerya Purchasi* MASK., fut